

Обследования необходимые для операций по сосудистой хирургии

Лабораторные анализы действительны 2 недели (сдавать натощак):

1. Анализ крови общий клинический с подсчётом лейкоцитарной формулы, СОЭ.
2. Анализ мочи общий.
3. Биохимическое исследование крови: глюкоза, общий билирубин, общий белок, мочевины, АЛТ, АСТ, калий, натрий, хлор, креатинин, общий холестерин, ферритин.
4. Коагулограмма: АЧТВ, протромбин (время по Квику, МНО), тромбиновое время, фибриноген.

1. Действительны 1 месяц и более:

5. Группа крови, резус фактор (*KELL-фенотипирование*).
6. ЭКГ в 12 отведениях с расчетом QTc (с описанием, годность 1 месяц) + эхокардиография (для лиц старше 45 лет, срок годности 3 месяца).
7. ИФА крови на сифилис (кровь на RW сроком годности 1 месяц).
8. Поверхностный антиген к гепатиту В (HbsAg), Антитела к гепатиту С (HCV) (срок годности 3 месяца).
9. Кровь на ВИЧ (анализ действителен 3 месяца).
10. Рентгенография органов грудной клетки (флюорография действительна 1 год)
11. УЗИ вен нижних конечностей (срок годности 1 месяц);
12. При сопутствующей патологии в анамнезе, необходимо заключение профильных врачей-специалистов с рекомендациями и указанием доз принимаемых препаратов (срок годности 1 месяц);
13. **Консультация врача-терапевта** (за 1-2 дня до операции, при себе иметь результаты обследований, годность 1 месяц).
14. **Консультация врача-анестезиолога** (в день операции в стационаре, при себе иметь результаты обследований).

Вы завершили обследование и готовы к операции. Напоминаем Вам:

- ✓ Если у вас назначена операция до 14.00ч., то последний прием пищи и воды - накануне вечером; если операция назначена после 14.00ч., то в 6.00ч – легкий завтрак и стакан воды, после – голод;
- ✓ **Запрещено выполнять операции:** в период обострения хронических заболеваний, острых респираторных инфекций, герпетических инфекций и при наличии первых катаральных явлений;
- ✓ На операцию **рекомендуется** приходиться без косметики и лака на ногтевых пластинках (хотя бы одного указательного пальца); без парфюмерии; без наращенных ресниц, без ювелирных украшений.
 - ✓ После операции Вы нуждаетесь в сопровождении и не сможете управлять автомобилем и другими ТС;
 - ✓ За две недели до операции **рекомендуется снизить** дозировку никотина до минимума.
 - ✓ Рекомендуется отменить прием КОК и внутриматочных спиралей минимум за 2-3 недели до операции;
 - ✓ Отменить приём «разжижающих» кровь препаратов: «Аспирин», «Кардиомагнил» и др., минимум за 5 дней до операции.
 - ✓ Госпитализация осуществляется в 8:00 (ул. Профсоюзная, 28), тел.: +(3452)56-03-03 Медицинский центр «LAPLAS» вход с надписью: «Стационар»
 - ✓ За 2-3 дня до операции просим Вас сообщить о подтверждении или отказе от операции

